庫全書

子部

欽定四庫

与子部

普濟方卷二百七十九

詳校官太醫院吏目臣同世泰 編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱

鈴

校對官中書臣楊世綸 **腾绿監生臣王** 錦

大きりを入事 邪流不出入人腹中乃至不殺古方謂與風腫で 以同受於風特 商倉腫門 毒腫附論 一證不止為虚浮而巴〇時疫脫胳腫毒病者古 病風毒結腫於皮膚肌肉之中亦有根於虚 普濟方 周王朱橚 八北熱増寒比 撰

聽俱非杜絕聞見病惡命危汗之益深疎利頓瘥初 硝之類苦泄寒凉之劑加倍併服得快利方為可救毒 後於熊劇山野順惟此患至今不絕互相傳染多至死 金歩びん人 喉鴨堵塞水樂難通攻外則頭面如牛眼耳穴監視 亡至有不保其家者其狀似雲頭腫連咽頸攻內則 方書論解不見其說古人無此病故無此方惟正隆楊 見增寒稍欲飲水脈沉不可温辛發汗急以大黃芒 公集拯濟方內言自天眷皇祐間生於衛北次於太原

炎定四車全書 蓋自然能通後於本方選而用之 消毒湯出海科 無稍退漸减凉樂理之 唱堵食樂不下 荆芥 苦參 獨活 黄連 漏蘆 防風 治 細辛 大黄 普濟方 切毒腫 崇本 當歸 黄本居官桂 葛根 当樂 川芎 枸杞子 地骨皮 無心草 嚴靈仙

金グロんとう 犀角丸 右為粗末每用樂半兩水二升葱三並槐柳枝各 雜瘡腫悉能內消 犀角螃 握同煎十餘沸去滓熱淋洗浴此樂用之如神百 蒴鞋 香木四菖蒲鄉朴硝西 甘草 総録奉 甘松 藿香 白芷 升麻 消花 二升麻去黑黄本土黑人家 治一切毒腫服之腫化為水 杜仲 巻二百七十九 秦皮 八到黄耆 零陵香谷 露蜂房

括婁大者一枚去 教零度香 芍藥玉龍膏出生濟 治一切毒腫疼痛摩風 欠己日本公言 消即止 右研巴且令極細末入餘樂並為細末入巴且和与 煉蜜和丸如梧桐子大每服五九米飲下加至十九 以利為度得利以温浆水粥助之常服即減八數種 栀子仁為四大黄、到三巴豆 三十枚去皮 防風去火當歸堪乾畫 教監 黃連縣甘草 治一切毒腫疼痛摩風止痛 普濟方 霍香葉

金万円屋という 五香連翹湯出聖濟 後入黃蠟欖自看鞭輕欲疑方可下麝香傾在磁瓦 右除黃蠟麝香外細剉如麻豆大以酒浸於銀石 器內慢火養一日次日添火熬令黃色用綿濾去滓 雠内候冷贴腫處 甘草或黄耆 杏仁學是去皮兴香白芷叫清油 半浸 两焙 半、麝香研、當歸八生薑切 治毒熱腫初結膿血未潰攻發 一兩鳥蛇

於定四車全書 八 大五香湯出聖游 服以利為度一方有甘草一兩 水一盏半煎至一盏入竹瀝三分再煎一沸去滓 右攻咀十味如麻豆大再入研樂和勻每服五錢用 疼痛 連翹 兩大黃两三 沉香 木香 射干 重陸香明れ 香麝香品 升麻 治毒氣攻肌肉腫痛寒熱心中煩 トンラニュ 獨活班 桑寄生 木通

分りし 漏蘆散出聖 腮 服不拘時候 石粗棉篩每服四錢用水| 蓋半煎至 | 蓋去滓 木香 漏蘆 吳来與湖沒去涎 薰陸香西一升麻 んくこう 白飲 鷄舌香 治毒腫疼痛心神煩熱大腸秘潘 黄芩 沉香對灌香葉母角到甘草 卷二百七十九 細辛去 麻黄去根桂 麻黄去根知母 松實殿其 皮击 粗 炙

飲定四庫全書 两 住氏五香湯出生 候温服 石切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烊分為二 右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時 當歸 黄葵 麝香研青木香 川大黄谷二两到 犀角屑 療毒腫 鷄古香 藿香 升麻 芒硝络三大黄五 と二 ヨヒトし 甘草泰数川芒硝 薰陸香

治諸毒腫膏方亦治熟瘡此时 大黄散息 右楊碎酒浸半月以猪膏二升煎之候氣歌 膏成 減去滓磁瓦器威塗貼腫處外臺秘要有枳實 服相去六七里久亦療諸平尸諸惡氣也 心 蛇衛草兩 朔翟根四山栀子仁大十 升麻 白飲 漏蘆班 連翹 芒硝和二黄 川大黄上雨木香一丁香两獨活而桑寄生 治毒腫恐惡氣入腹服此疎利毒氣

沙定四車全書 四 右切以水六升煮取二升半去浑分三服其間消息 以意量之毒腫不治必殺人也 右為散入麝香研令自每服五錢水一大蓋煎至五 分去浑食前温服 门湯出聖 射干和一 薰陸香 青木香 沉香分升麻分 惠方 甘草生用麝香和研 普湾方 鷄舌香 藿香 犀角鳍鱼

消腫木香散院方 麻子小豆湯出す まえし 人へ 腹刺痛煩悶者此是毒氣深腫所致也 右吹咀以水四升先煮四味取二升半去滓次研麻 子碎和汁煮一沸濾去浑取爛汁煮豆其汁每服五 合日二夜一以利小便為度腫退則瘥并食豆 升麻啊 麻子 赤小豆各半生商陸上附子四射干四 治毒腫無定處或赤色惡寒或心 卷二百七十九 治濕毒腫皮肉色不變

於軍里東全時 右為細末每用樂一大匙入白麪一匙頭淡醋調稀 慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿令大乾則 换新樂 | 日四五次 汾 治諸瘡毒腫 當歸 黄芩 射干 連翹 普遍方 莽草 大黄

沉香散出聖 金グロルる 大貨丸 候温服 右為散每服四錢水一中盛煎至六分去滓不拘時 右水煎三五錢去滓無時服 川大黃三两到 沉香 木香 出聖濟 、微炒三雨 甘草两 杏仁研如膏四两、切作小槐酒甘草炙三杏仁去皮尖并雙 治毒腫入腹心問腹脹不欲飲食 治風毒熱結日夜疼痛心煩惧問 丁香 卷二 百七十九 薰陸香香

更主四東全馬 莽草散 出聖濟 度 煉審為九如梧桐子大每服十五九温酒下初服未 右為細末別以榆根對搗紋取汁調樂於故帛上貼 利加二十九臟腑實則三十九量虚實服之以功為 右先将三味捣羅為末後入芒硝末杏仁膏同和入 莽草的子性去皮木香 白飲 桂生去粗 詞熱勒三兩 芒硝两五 治惡毒風腫不消結成堅核 普齊方 皮

重发目 猏 **乾則易之開一小竅出毒** 四服空心温服日夜令盡小便利即毒腫消 右吹咀以水五升先煮麻子取三升去滓研麻子 令破以麻子汁煮樂以豆熟為度去滓取二升 麻子一升 飲出聖 射干 んとです 半 附子婚的去皮商陸根薄切赤小豆 治毒腫無定處或根標惡寒心腹刺 卷二百七十九 及軍四東至 **葛根牛蒡子湯出蜜科** 秘要有升麻 右細末每服三錢用水調下此病近代患者傳染多 抵與傷寒頗類其中亦有可針錄砭射出血者亦有 虚實表裏之分治之者須詳其汗下吐之不同大 致大枉治之者不得其法只云大熟使然不知亦有 久而敗爛出腺者其、間變易百端不可不慎也 萬根 管伸 甘草 普減方 治時毒大頭病是也 鹹改 牛蒡子的

繁柳散 きなり 洗毒湯 右為細散以新水調和如糊塗貼腫上乾即易之 右為末以水和之傳上乾即易一方無莽 爁為度 繁柳焼灰白飲一赤小豆一大黄 入黃川奶大通到夢産物上非草和 ルノデー 出聖 特要 出詹科 總錄 业业 濟 治初覺腫漏令消 治腫毒 卷二百七十九

文王日東公島 檀香飲出聖濟 紫堂子散出聖 右各於砂盆中以水三蓋磨取盡濾去洋銀石銚 右為末用凝水調塗腫處乾即易之 右各等分或咀水煮濃洗瘡腫 白檀香 沉香二城重檳榔一 苦參 防風 雲量子 桑葉 龍葵而牛蒡子两 治毒腫不消時有疼痛 解惡毒風腫 甘草麥露蜂房 普瀬方

消毒散 消毒九出海生 追風毒消腫散 金としたイー 右為細末水調舊翎棉豆消 右為細末醋調塗腫處乾即易力 内煎沸候温分作三服 附子每头皮石硫黄胡天南星生的 大貨 牙硝 青黛各等分 消脫胳腫毒 治時毒疙瘩惡證 卷二百七十九

次記回車至 治毒腫不問軟硬方 内消膏 大黄散出聖 内加桔梗鼠 粘子九妙 右為細末煉蜜為九彈子大新汲水化下一九無時 石相和熬成膏塗於腫上日二易之 肥皂炭 惠方 出聖 壮輔燒白殭蠶炒各 鐘漫按取汁二挺以好酒 治毒腫惡瘡如為 治熱毒腫 将済方 青鹽 啊 硝石分 PEJ

内消毒散 金矢せるスコテ 便撮合 石並燒候煙絕即出勿令作灰 細研以生麻油調 塗於故帛上貼之如膿未出當便內消膿已出即 石為細散研生薑汁調達乾即再塗 白飲 蜀溪根 惠出方程 恵出な聖 白韭 船子根 治毒腫痛不可思 白发为 卷二百七十九 冬瓜根各五

惹熨方此經濟 治惡毒風腫及白虎風痛 大三四百人E 保救膏出程濟 治諸腫毒及熟毒氣腫 石為末以醋塗於腫上乾即更塗 右相和煮沸漉出葱用布帛熱裹當腫上熨之冷 即更煮依前熨以搖為度 虎角而磨刀粗石烟者白飲 顾时悉白切三 极葉五馬盡道港與根三動 普齊方 크

金女世人人言 治熱毒腫方則 治項側屬少陽經中完齊 自然汁 右用水五斗慢火煮時将柳木根攬至一斗許住 時以鷄翎掃樂如瘡腫痛以軟帛子貼之一方用 右為散以鷄子清和貼婚乾即易 **火放冷濾去滓将汁再熬令濃以新磁碟子風用** 變青根 紫臺 卷二百七十九 当禁為三 人辨肉色不 分大小

交至四事全書 懷香草飲此千 解惡毒風腫或者人陰或者一邊 以生懷香草不拘多少搖後取汁每服一合用酒三 疼痛擊急牵引小腹問亂難己 合同煎令沸空心晚食前温服一方無酒渣數腫 石搗爛攤在帛上貼之如神 月深沒或赤硬腫痛此降生 上冬月缺生者根亦可此是外國神方用之起死 生山樂士及草麻子個 普済方

治 金グロカノー 治一切毒腫 電土塗方出聖濟 治毒腫 治毒腫 回生神劾 以生大豆搗爛塗之 取竈底黃土以醋研和塗腫上日三五度 以胡葱熟捣和生油調塗之即瘥 一切毒腫不問軟硬出聖 卷二百七十九 飲定四庫全書 治腫大如斗 治背上忽腫漸如碟子不識名者 人方 洗腫處立瘥 用水中圆石一两塊焼令極熱瀉入清水中沸定後 炊之發中水浸酸食之暖五職六腑氣 以粳米久陳者蒸作飯和醋封毒腫立瘥又北人 以生搗秫米和以鷄子白敷之良 普瀬方 十四

治毒腫 治風腫毒初起急痛此时 良 月蔓青根大者削去上皮熱搗苦酒和如泥煮 雙腫取雨邊翅並燒灰研飲服之 用决明子調塗之 取鷄翅毛一孔生雨毛佳右腫取左翅左腫取石翅 二沸急攪之出數腫帛裹上日再三易用子亦 後出 方刖 卷二百七十 れ 火王四年という 治 治脚腫向上至腹即殺人者坐方 李兵手即方出外科 者 用胡麻子熟捣敷之即瘥 菜米麪等如渴飲汁瘥乃止 日一度瘥止若已竟入腹不須浸但煮且食之忌鹽 用赤小豆以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每 切毒腫疼痛不可忍者坐す 寮毒 瘡腫 號叶取不得人不識 哲涵方 五

治毒腫漏 治毒攻手足腫痛欲絕者此財 治毒腫出財 金グモルスコー 取松枝燒研為細末塗之以帛裹其上良 以猪蹄一具和葱煮去渣内鹽少許以數之 以鷄腸草敷? 之瘥 以獨頭大蒜兩類細搖以麻油和研敷瘡上乾即 巻二百七十九

又方思智 又方思な 炎定四事多書 治熱毒腫痛不消患者 治毒腫入腹疼痛或牵小腹及腰胯痛方出聖 用葵菜根和鹽塩數之 用桃仁二合湯浸去皮尖及雙仁研如膏每服以暖 用桑花五两為末生蜜調塗數腫上 酒調下小彈子大日三四服 普濟方 大

又方出聖 頻服 用狗舌草一動去兩頭以水五升於銅器中 用地松搗汁每服一小毉日四五服 用鷄子清封腫上熟即易之 用益母草三握去兩頭以酒三升煎取一升去 惠方 リんくごう 出聖 惠出 巻二百七十九

治毒腫出本 大江日日本 治毒腫出本 治毒腫 劾 用石蒜搖敷貼 醋磨大黄塗愚處即消此方得林庇民云嘗試易 以猶草葉搗製 升去滓搜麪作羹粥食之 草 普濟方

治毒腫結熟與本 治毒腫以本 金火儿人人 治毒腫止本 以由跋用苦酒磨塗腫處効 重有毒風為水流在葉中如冬月取乾葉鹽浸良 久用之或取根皮剉爛捣數之皆勢 取揪葉十重般腫上即以舊帛裏之日三易當重 以生瓜菜提貼 草 不問硬軟 卷二百七十九

治腫毒出本 **缺定四車全書** 治毒腫出聖 治腫毒性本 諸痛瘡癢皆屬於心心虚寒則養心實熟則 用地类蓉葉捣數貼 用地蜈蚣水摩塗 以瓮近下鑽一孔威水注於腫上 丹毒附為 上普済方 + 1.

陽即發丹毒方論有云以其色亦如丹砂塗之故得丹 毒之病由心實熱也心生血主脈血熱則肌浮陰滯於 為也〇凡火丹者肉中或赤如丹塗之色漏樣不定甚 能出入亦患此者是豈因犯即病乎大率皆血氣之所 有赤硫天火殃火尿竈廢竈野火等方以為小兒出 入遊行觸犯所致此因容或有之若小兒在襁褓中未 名然又有水丹白丹五色丹油丹豈專以亦為名也又 至過身白丹者肌肉腫起養痛如咬状鷄冠丹者亦名

欽定四庫全書 熱腫等證者取渠中藻菜細切熱想數丹上學三 多無出用冷物治之凡冷物無過激菜如有患丹毒 来 與丹肉上果起如鷄冠水丹者偏身熱起黄色如 自四肢生入腹者則難治○治丹毒方干金外臺甚 水在皮中五色油丹亦名油腫赤流丹腫熟赤色流 分乾則易之甚良〇熱毒之氣暴發於皮膚間 田野火等丹多着少小但自腹内生出四肢者則易愈 入四肢以上皆不問大小如天火螢火殃火尿竈未 長二 ラヒトし

骨節之間則肢斷如截毒氣入腹則能殺人治法用 掌甚則周流四體不急治或至壞爛出膿血發勢於 自心生豈可便用辛温發散致熱勢增剥漸成職毒 氣而感之於人也其後發於異面耳項咽喉亦腫無 得外出則血為丹毒熱氣燥悍其發無常處大則如 下血咬牙發擋大熱明矣○夫時毒者四時邪毒之 日諸痛瘡瘍皆屬於心火土大關又謂百端之起皆 針鎌砭割不可緩治也○少陽客氣勝丹疹外發又

之氣初發狀如傷寒五七日之間乃能殺人治之宜 一次を四東へいち 之丹瘤與夫時毒固不同耳蓋時毒者感四時不正 忽經變亦狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為謂 腫起 益增方悟始召瘡醫原夫此疾並無方論世俗通 精辨之先胗其脈滑數浮洪沉緊殆潘皆其候也蓋 謂丹瘤病家惡言時毒竊恐傳染考之於經曰人身 不寧咽喉用塞人不識者将謂傷寒便服解樂一二日 頭或結核有瘡令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚 普齊す

香連翹湯主之又於鼻內舊通風散取十餘嚏作効若 **北實之人急服化毒丹以攻之熱實以五利大黃湯** 每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經 看病之人日用嘴樂嚏之必不傳染切須記之其病人 審樂不嚏不可治之如嚏出腺血者治之必愈如左右 浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深入也感四時毒氣 三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角散連 下之其有表證者解毒升麻湯以發之或氣軟者五

とこの目へいう 聲不出頭面不腫食不知味者即死之候然而此疾有 服光裏散黃者散宜針隸砭割出血泄其毒氣十日外 **惶有陽有可汗有可下當見粗工但云熱毒則用寒樂** 不治自愈也此病者五日以前精神昏亂咽喉閉塞語 殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣 翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起髙赤者可 治風邪毒氣外客皮膚黨發成腫所起 普遍方 Ŧ

多分四月全書 右細剉以臘月猪脂二的丈火煎候白芷亦黑色為 度綿濾去海下蠟入磁器內威每用取少許摩之令 **焮赤多膿瘡邊緊急但是風腫並皆治之** 不定遊走往來時發癢痛或風毒熱威攻汪成瘡 漢椒母 半夏 附子各一两 川芎 吳茱萸 香白芷的半鳥蛇 藁木 防風 獨活 卷二百七十九 赤芍樂 白殭髮情妙細辛 黄蝦為二克明 當歸 桂心

升麻膏 惠步 治丹鄉煩熱疼痛不止 熱日三一方有芒硝 硼砂九息東海 at I'm Duel I.h. 右捣碎以水三升浸半升再以猪膏五升煎令水氣 盖去浑膏成傅上諸丹皆用之及熱瘡腫上日三經 心録無枳實以治諸毒腫 升麻 白微时後作漏蘆 蛇哪草 枳實為三 治丹毒遊走及魚臍瘡 普遍方 朝聖各四黃本四 至

漏蘆湯出聖 多分四月全世 調麪塗故帛贴兩宿痛止即揭去収樂九可再用 藥調為九如梧桐子大先用針撥破瘡口入一九醋 右除蠟捣好為細末先将蠟於磁器內慢火上鎔下 白殿 漏蘆去廣白飲 硼砂研维准尿 一麝香鄉一白蠟 濟 治丹毒遊走揭洗後服 桂皮 粉膽敗硫黃 黄冬去黑麻黄去根節 卷二百 半一天南星分鷓鴣嘴叫 セナカ 丹砂 沫湯升 細研

黄本湯此聖游 吳監湯出聖海 ころしのら これら 右細剉每用半兩以竹瀝一盞水七盞同煎至四盞 右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去海食 去渣以故帛浸榻患處一日五七次 後温服至晚再服以瘥為度 鳑白飲 吳藍加生地黄 升麻 栀子仁 大黄两半 揭洗丹毒癰疽始發城熱浸淫 楊洗丹毒 普濟方 石膏 黄本世黑犀角 圭

金花散出三 多分四月全世 半兩欖与以故帛三兩重浸樂汁濕楊患處數十 右細剉每用一兩以水五盞煎至三盞去渣下芒硝 遍早晚用以瘥為度 石各一兩生為末、蜜和冷水調以鵝毛上患處 肯孝是黑升麻各一黄連去考窮各一甘草到 鬱金 當婦去廣野羊角轉各 贵苓 甘草 治一切丹毒 卷二百七十九 山栀 大黄 黃連 糯米


产生四年十二日 哪 升麻湯一名湯蘆湯 諸丹毒上常令濕揚後須服飲子并漏蘆湯方併見 右吹咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故帛杂汁榻 方内不用朔龍一方無黃芩 前癰腫係中服之立瘥小品用治丹齊諸毒腫聖濟 疼漏 枚 升麻西湯蘆 出干金方 些硝每二黄冬两朔鞋两栀子 普濟方 治毒方及丹疹毒氣不消時發 盂

牛黃散 胡粉塗敷方出聖泽 右除水銀外搖羅為散生油調如糊後取水銀於堂 乾月樂塗數日三兩遍 中以津極好如泥入樂內研与先以椒湯洗丹上 山茱萸雨 胡粉 鬱金 治腫丹毒 赤小豆 甘草 桔梗 治風丹 糯米 黄連去騎各水銀料 卷二百七十九 天花粉 蛤粉

沙主四草至 四順清凉飲子 治一切丹毒猜熱壅滯咽喉腫痛 金花散出聖 右為細末每用蜜水調令稀稠得所用鷄翎薄 後温服 右為末每服一錢薄荷湯入臺水調服 右等分改咀每服一錢水一盏半煎至七分去渣食 當歸 甘草 芍藥 大黄 鬱金两黃連和黃芩两糯米 治一切丹毒熱城疼痛 普濟方 至

治丹毒 金ケリルノニー 又方此聖濟 右到搖令熟調數患處數次 丹上乾即便塗 右為末和入酒少許細研成膏塗患處乾即易 總銀星 政一香業 光料草 治丹毒遍身赤腫 治赤黑丹 蛇即草 教禁两半 巻二 百七十九 慎火草西

次至四車全馬 治一切丹毒惡氣攻刺身體亦腫疼痛不可忍方出聖 右欄研塗之乾即更塗 右同燒存性為末和蜜塗之一方以鷄子白和塗之 右以水一斗煮取四升以帛楊洗之隨手消神劾 赤小豆升羊角對 車前子 盆母草 地膽草 蛇蜕皮無露蜂房西新附淋草半 治火丹 普褲方



文色日華人的 又方金す 方息方 方出聖 以五葉草搗爛塗之 以五葉騰協為末水調塗之 以生水松菜狼爛数之 以生地黄椹汁塗之熱即易赤小豆亦佳 出聖 普濟方 耄

又方選す 金人工人人 方名妆毒膏 用大黄為末水和數之 以栀子仁為末水和塗之 以浮萍草搖爛塗之 選出

す

百 治火丹毒 治丹毒 卷二百七十九

次主四車人 治諸丹神驗方出升 閉合不得開幾至弱斃以種種樂治不瘥經七日余 自處此方其驗如神故留之以傳來世云耳 不得近手五更時至於右角至夜諸處皆到其眼遂 歇以絕本根昔有人飲多至夜睡中覺四肢過體骨 肉疼痛比至晚頭痛目眩左額角上如彈丸大腫痛 以三日內封使醒醒好獲上也然縱乾亦封之勿絕 以羹薹菜熱搖厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但 普海方 文

又方出す 治赤流腫丹毒 治五色油丹方出于 輕之 取榆根白皮為末鷄子白和傅之千金翼云鷄子白 多致死不可輕之出聖 用亲豆作枕頭即甚良 和蒲席灰傅 一方云治五色油丹俗名油腫岩犯 俗名油腫岩犯者多致死不可 卷二百七十九 大きの事から 丁 香樂皮方出す 又方继録息 赤或白或癢或痛或寒或熱者 堪大麻子和傅之 以樂皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患處 用生猪肉切片贴之牛肉亦可 身體卒亦黑丹起如於狀不治日劇過身即殺人或 以煎羊脂摩之得青羊脂最良集驗方云治人面目 治丹毒流移不定 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或 普済す 九

伏龍肝散出る 金ケロんという 赤小豆全博方思十便 用赤小豆堪羅為末以鷄子白調如糊塗丹上乾即 神劾 易先用枸杞根煎湯洗後數瘡如痛用水潤之 用伏龍肝不拘多少為末以鷄子白和傳之日 涓癢或微生瘡 治少 小诸腫丹毒 卷二百七十九 治丹毒如手掌大身體赤磁

יוליין דפינטריין 又方出聖濟 又方 地 聖 海 治丹毒過身赤腫與母海 毅患處乾即愈外臺秘要無酸汁飲之佳 以惡實根五兩取時勿今見風及鷄犬剉堪熱水調 用生離蔔一味搗餃取汁調丹上日三五次 日三五次 以猪屎燒灰細研為散以鷄子白旋調如糊塗丹上 治赤黑丹魚治惡瘡亦治小兒白丹 普遍方 圭

又方出 我玩四月全書 治諸丹毒方出聖海 雞蘇全方出聖海 傳然後服樂 取尝薹汁入大黄末芒硝生鐵衣相和塗之佳 **搗生雞蘇厚堂之** 研政和屋塵等分以苦酒調傳? 總銀經濟 方肘 治火丹亦療白丹 治火丹熱毒之氣五色為定宜先 卷二百七十九

CALIDIAN ZAMO 治刑繁丹走皮中浸淫一名火丹及諸瘡疼痛 治丹毒五色無常者一名鹿角散此时 纏蛇丹方 疥不急治過身即死 燒鹿角為末和猪脂數之一云治面目亦黑丹如 取蠐螬捣敷之糞中者尤住一方用研以鷄子清 取連錢草以鹽桜数之 以雄黄為末水調堂兼用酒調服 普遍方 Ŧ. 出聖

人方出聖 治丹毒惡詹五色無常者後方 部分四峰全世 治丹毒發作恐其入腹一時無樂秘方 捣尜厚数轧即易大小尜钻可 此蓋疽之類也 調達之乾即再塗 可忍若壞皮膚則出膿血或發骨節即斷人四肢 煮栗皮有刺者洗之佳 治發足及一切丹毒惡氣五色無常痛不 巻二百七十九

治丹者惡毒之氣結成無色無定出 治螢火丹從頭起出十 治火丹方忠す 鰋蛇丹方 CALIBRED LAIN 用紫背草老鵝草擂搖爛塗之愈 急以針於紅點處刺出惡血使毒氣於此而散 用黄芩為末水調塗上 以醋逢之消 普濟方 方刖

又方とけ 多分四月全書 义方治丹毒 療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或養極了腫起 煮栗取濃汁以洗之妙 以蜜和乾薑末堂之驗、 用羚羊角或羚羊角屑三两水一大盆濃煎 摩? 不即祭之甚至殺人出十便 取曲鳝糞水和如泥塗之 治火丹 卷二百七十九

うしつはんい 療白丹方思す 者皆可用摩務令分散毒氣或水摩羚羊角塗之 数百遍若無羊角用羊脂及猪脂煉候冷摩有毒 以豉為末和酒塗之搗香薷葉苦熨數之一方單用 疹起不痛不亦而白色由挾風冷故然色白也 以猪槽下土泥塗之又以猪肉灼熨之即瘥 方燒灰三兩細研以鷄子白調敷 病原白丹者初發癢痛微煩腫如吹 普済す

え方 多丘四月全書 治白丹水丹者人足趺及腨脛間者作黃色如火丹状 政為末水調堂之 佳 成骨瘡即難瘥也經言風邪客於肌中肌虚真氣 以酸模草五葉草煮汁飲之又以渣傅丹上以薺亦 經久變紫色不療皆成骨瘡也無毒非殺人疾若 **经散义被寒氣搏於皮膚外發腠理開毫毛淫氣** 卷二百七十九

治風丹 たどりをいき 療丹毒或發行及諸腫過身亦者 法也療之方傷白磁器屑以猪膏和塗之 撥之隨手起有白虧者亦見此證也療之皆如療丹 者忽起如蚊蚤咬微煩且養剔者少項即漸漸腫起 協腳魚數數易之良或但以生魚及燒傷末以雞子 妄行則為癢也所以有風疹之疾皆由於此有赤癬 白和塗之 普済方

又古 治一切丹毒迪用方 又方 動好四屆人事 豪調土殊入酒少許服并 擦疹上 用芭蕉根搗自然汁塗及竈中黄土以水調塗 用黄栢朴硝為末水調塗之 以苔帯子順火草葉土硃三件中遇便者擂碎冷 水澄濾過服之効 卷二百七十九

又方後方 CIND DIEL LIMIT 治天母丹 治白丹忠す 治火飲丹并纏腰丹 鷄毛熊刷之或用老鴉草搗汁刷之 用陳壁泥炒出火毒以鷄子清調數之又用絲瓜水 用生鐵為末猪膽汁為膏調即可 **떛鷄屎鷄子白和塗之或以鷄糞汁拭之** 治天母丹 持済る 萐

又方後方 又方息を 金为四月有量 亦良 用鼠粘草根勿使見風洗去土搗爛貼之絞取汁飲? 每日仍塗之 以苧根三的小豆四升水二斗煮浴之一方無小豆 以生魚血塗之若走行皮中浸廣者名火丹至腹殺 或用魚膽和鹽傳之乾即易 治一切丹毒流腫

炎主四車公馬 治一切丹毒偏身方息力 発草膏 思を 拘時候温服一合 用尝薹子一雨以酒一大盞和斫去滓煎至七沸了 以傳病日三以產為度一方無椒 右切以猪膏合煎之候附子色黄膏成濾去滓收貯 步樂 光花 附子地椒谷四猪脂二的 莽草分當歸 皆窮 療身體赤隱亦而養極之隨手腫 普湾を 躑躅花 大戟 きた 細辛

右搖篩蜜和為九如梧桐子大酒服十九日二服稍 鮮猪肉冷水生葱此療風疹正方凡風皆由舊水有 加至十五九若能作散服一錢禁食桃李雀肉青魚 風氣所以方中不得已用桂心附子白木既用一的附 子只有三分復有防風其防風即能斷附子毒所以 物毒有一物制伏聽進止 白木的蔓荆子的防風的附子地。桂心如 瘵 赤白二疹丸 人ノア 老二百七十八

というしていたい 治凡亦鄉勢時發冷即止白鄉天陰冷即發方鬼 又方思す 療丹瘾珍出时 以白芷根葉煮汁洗之劾 以酪和鹽煮熟以摩之手下即消也 瘾婚相連而微養故謂之丹麼 以順火草葉爛搖封之甚良一方作體火草 恵方 出聖 病原丹齊者內色不變又不熱但起 普濟方 Ī 暒


又方選す 人方忠な 入方 動好山川有書 淋石灰汁清之及洗之一方以石灰和醋調塗 解准肉 以白术未酒服方寸匙三日盡五觔尽桃李恭青魚 以酒煮蒴灌拭之良一方用葉塩塗之 以酒煮石楠拭之極効 出百一 治丹疹及燥瘤 卷二百七十九 ただりはいから 又方出な 又方息方 又其亦瘮心家稍虚熱氣相搏其色亦宜作芒硝湯 拭之出す 以芒硝三兩用湯一升內芒硝令消散以吊沾取拭 以幾石二兩酒三的清令學拭上立程或但以水煮 白봻汁 取芥子末以酢浆水服方寸匙日三服獲 療身體亦應齊西養極之隨手腫 普濟方 支

白彩者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏遂為白敷 每分四件全書 夫赤癣由冷濕搏於肌中甚即為熱成赤癣也得天熱 則劇得冷即减此方療之及治一切丹毒也質 也得天陰雨則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣 齊即漸除湯盡更合以前二件赤白齊方 一方治 身暖亦减此方糜之 取生蛇即草搖極爛以塗之最驗 丹毒以芒硝細研為末水調塗之 卷二百七十九 忠方

たとり見いか 治丹毒此时 治五色遊毒出十 治丹毒此百一 用豆葉捣塗之 用牛糞塗之乾即易 **教作菜食之益人去脂膏毒氣** 用鷄腸草生掘爛如沉封上用五六次劾亦可生食 以水煮枳實拭之住又堪木於膏青布裹熨之又 普濟方

治經胺丹毒出家被 十二味單方良方 動戶四月全書 右十二味但得一物協以貼之即應赤小豆末和雞 **棉松葉塗之愈** 子塗之無難子水和用之 硝 浮葬草 水苔 生地黄 互或水大黄 机栀子水黄芩水豆葉 療丹毒或得一物瘥方 生松葉 朔難葉 卷二百七十九 慎火草

文主四事人言 團 療簧火丹從頭起当本 治積年久癣有時發動 僚竈丹從雨脚起赤如火燒出本 用乾地黄十分甘草五分乾漆五分木五分桂一尺 用五加葉根焼灰五兩取煅鐵像伙槽中水塗之 捣篩酒服一匙日三服 先用麻油搽次用糯米同韭擂成膏塗 以慎火草想和苦酒塗之 皆清方 早



治熱腫丹毒草 治熱丹毒雞腫出 治教丹赤種出 **处已日后公司** 療煙火丹發從背起或兩脇及足亦如火 以陳白发磨敷瘡上 以積雪草搗敷ラ 用栝蒌為末二兩釅醋調塗> 門熱腫類上出本草見本 出本 出本 出本 普濟方

處立止用法之人大思五辛之菜五厭之肉所病之人 端想北滔天水山無際大寒嚴冷之氣一口吹在瘡 腫之 夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止有勢一法面北 治丹毒瘤出本 我好四月全書 以景天草珠末一兩搖和如泥塗之 難猪魚尾酒酯濕麪等物無樂之處可用此法枚 以蜈蚣一條乾者白罄 皂子大一塊雷九一箇百部 二錢秤同為末醋調茶 卷二百七十九 出儒

Str. Jours Links 浆摘破出水日水疥養而極之皮起乾痂日乾疥海皮 英不均有蟲也亦其不易為之染獨也城亦養痛作 風毒之沉深者為解於則多因風毒快熱得之解則多 瘡有膿日大瘡隠起帶根極不知痛曰馬疥疫編含 因風毒快濕得之疥發於手足或至於遍身鮮則肌肉 瘾癣或圓或科或如苔莓走散内藏汁而外有筐二者 夫疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥 疥癣附論 普濟方 罕

固已然殺蟲於其外亦須以硫黄輕粉蠟礬之輩服 時則微癢白點相連是之謂狗癬輪郭全無縱橫不 定是之謂刀癬此癬之種類然也疥癬治法驅風殺蟲 擦痺頑不知痛癢牛癬則狀如牛領皮厚而堅其有 **新厅四川全書** 者無熱用樂加減又當權行 餌而內濟之無絕其根矣若夫腫而濕者有熱搞而乾 白屑索然彫枯濕癬則淫如蟲行搔之多汁風癬則爪 小瘡常常淫汁曰濕疥此疥之名目然也乾癣則極出 卷二百七十九

とさりたという 加減 一兩丹祭 桂 松脂谷一 獨活去 邁明防風之黃耆 ハ風散 皮粗狗鞋布 總出 銀聖 兩蛇床子少黃連着於 人参 芎窮 仁其皮尖及木通 治風毒疥癬 普濟方 防巴 秦光去断名白 去則极香脂)当甘菊花 ·各一兩一 白飲 天門冬山 1 細辛

前站膏业す 多分四月分量 加至三服 石搗以苦酒浸一宿明旦以煎成猪膏四升煎三上: 石為散每服二錢空心用生薑麼湯調下晚再服漸 當歸 簡站 潘各 根牙 山茱萸 扁畜馬二蛇床子 意志一的磁石三两以火燒通赤 治一切惡瘡疥癬疽瘤 青箱 幾生乾地黃 卷二百七十九 地榆 白飲谷六漏蘆 一地骨皮 羊蹄根 当

天王日日 八十百 瘡樂如神膏 數樂不可近目及陰先研雄黃等令細候膏小冷即 百遍止用磁器器貯封固勿令泄氣煎膏法必微火 和傅之 右細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋攙數 ·膚成終去渣加後樂如左 雄黄 水銀馬 雌黄 硫黄 普遍方 攀石 胡 粉 聖山

金好四月全書 右吹咀入香油半碗浸樂春秋五日夏三冬七熬黑 与侯只将油敷瘡 色為度再下烏桕油一小碗半寸斷柳槐條一 隨多少用下明禁一錢為率先用乳香研細下急攢 用视柳枝條機今与濾净再下硫黄雄黃黃丹輕粉 黄芩 荆芥 黃鰈 花椒 殭蠶 檳榔 黄連 防風 卷二百七十九 班猫女母好蛇床子 當歸鬚 巴豆杜紫草 川当 白芷 一握及

磨樂方出 春科 一大主四事 全与 烏蛇散一名五麥散馬 右為末用黃龍骨青龍皮龍鬚各一兩半納香油六 鍾奏枯去渣又加入黄蠟硫黄各一兩半同樂末和 膏於瓦瓶內收貯用之住 輕粉或雄黃錢大楓子肉錢蛇床子升膽裝十 芒硝 年 明 整十 信 半 Į 治諸般亦與小兒眉臉威風並皆治 出聖 普齊方 治疥癬久不瘥遍身頭 星 猋

金ケリカノア 為度一 面ध生皮膚瘙癢 右為散每於食後薄荷湯調下二錢至晚再服以瘥 **划白殭麵** 頭去 鳥蛇酒是吳黃色漏蘆 啊 臍 董丹參 半 出瘡科 方無乾竭 妙記蚂步去土麻黄三两 附子 治办 沙麥班 蘆玄麥 巻二百七十九 一两半大黄 五加皮 甘草 去炮 皮裂 赤 矣

という見いい 右細剉如麻豆大於油內煎至焦紫色令冷濾去滓 凝磁盒内收貯用以塗彡 上火入黃雕猪脂鎔開再重綿濾過入輕粉粉霜攪 瘡侵餓疼痛膿汁浸淫蔓延經久不瘥者 脂品油的 川営 草鳥頭 狼毒 觔 Ų 釣岑根 木鱉子用天麻 藜蘆 治腎臟風虚攻注手足頭面麻痺痛 輕粉分一粉霜品研黃蠟两雕 普海方 聖

多好四月全書 天麻散出療科 温酒送下 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心 癢或生疥癬腫焮 陳皮各等 黃耆 防風 藜蘆 天麻 赤小豆 烏樂 治白禿疳瘡及風毒疥癬 狼毒 尚香妙地龍土川椒玉川練子 白英教去海桐皮 卷二百七十九 白芷 歯草 威靈仙 釣苓根

たれり車とい 右為細求每用樂半兩紙一重綿裹入油三兩浸經 解樂方 三日外熊指蔡惠處如稍乾更添油二两添至三兩 一换 樂其効如神 輕粉與雄黃錢大楓子錢蛇床子升瞻祭 草鳥頭 兩六 信後一芒硝二錢硫黄一两半巴黄蠟一两香油 管仲 普遍方 細辛各半輕粉錢雄黃二 里 明礬

金月四月月 除濕散 右為細末每服三錢茶酒下無時日進三服六日 右用槐條柳皮各一兩葱鬚二兩二味下清油熬 不用濾出下黃蠟鎔化次下前樂再攪少時為度 浴令汗出宣通一月膚澤如故 苦參 白芷 出聖 大治一切風毒疥癬瘙癢狀如風癇 何首鳥 天麻 川芎 治遍身瘙癢癖疥瘡瘍 卷二百七十九 荆芥穗 防風班生鳥蛇酒是二宿 蔓荆子 海尚

如聖散 PETER STATE OF THE 右為細末傷干下丸如梧桐子大每服三十九選水 右為細末清油調搽 下食後日進三服茶酒任下亦得 蛇床子四黄柏 苦祭 香熟 防風去兴 黄本心 栀子 苦參四玄祭 黃連其枳殼去數獨活或 大黄 藜蘆 剪草 輕粉 治亦風瘡癬 普海方 胡粉各半 簡弘西二白巻 狗脊 叉

治亦直諸瘡方出十 多月四月全書 丹砂膏出聖 右水銀胡粉另研如泥餘為末以煎成猪膏合和研 令調以數之一方無薑黄 簡如各其指的巴豆十四枚去 附子 水銀 雄黄 苦參 胡粉分二黄連 治久疥癬瘡癢不止宜用此殺蟲 惟黄谷三 蛇床子分三 卷二百七十九 乳髮淨松脂 薑黄 # 裝石 白蜜

たとりをという 徐長即散塗方 地程鄉 治諸疥癬久不瘥者 諸末更煎一沸上以敷之一方用蠟不用蜜 右先以猪脂煎髮消盡內松脂蜜三上三下去渣內 安被内蓋令熱雨上瘥 右等分搗羅為散先以油煎葱白色黄将油和藥 **末塗仍先以湯浴了手足並用被覆更将火桶子** 苦參 附子皮癖吳茱萸乾炒早連子 石硫黄 菖蒲 半夏生 普濟方 四九 細辛

多月口居石書 右用好酒煮巴豆焦黑去巴豆不用入黄蠟四錢 信半-細辛 硫黄终二黄相與 人油量稀稠擦塗 精要科 越巴豆仁 治惡疥癬瘡 治遊風腫癢 白芷 卷二百七十九 川芎 大黃 黄芩 行或因洗頭遊風瘙 黄芩 防風 甘草

いていこうしん ハトラ 何首烏散出和 氣上攻頭面生瘡及治紫癜白癜頑癬 生瘾療極之成瘡局背拘壓肌肉頑痺手足皴裂風 處 右為粗末每用樂二兩水兩碗煎十 荆芥穗 义 何首鳥之 董甘草矣 地骨皮分等 蔓荆子皮 蚵蝦草土威雪仙港防風 治脾肺風毒攻衝遍身疥癬瘙癢或 普遍方 至

水銀膏 祛風丸 **铋** 近库全書 湯亦得 右各五升搗羅為末每服一錢食後温酒調| 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九空心酒 夜蜜湯下 槐芽乾皂英芽片的 告祭四防風又羌活頭各 三分烏蛇一條酒多史君子十 總録奉 治癌瘡疥癬無名惡瘡但是手足瘡 治 | 切疥癣 頑瘡 卷二百七十九 啊

とかりまといる 如意散松す 者 摩 渣再入蠟鎔開出火稍疑下水銀裝石攪匀每用塗 石用雕猪脂七雨熬膏下三件剉樂煮至焦紫色去 淫多汁久而蟲生塗之 黄連刺三 黃蠟一問弘一 蛇床子做白礬枯水銀各二 治疥癬無時痛癢愈發有時不已久新 普海方 至

動片四四全書 海桐散 愈出論宣 石為細末研与每服臨民炒 半如後有養不止更少放堂之股脾之間聞香悉 信础分 輕粉し酸 海桐皮 吳茱萸 治疥癣 簡茹 牛蒡子 卷二百七十九 黑狗脊 荆芥西各 蛇床子 錢油調遍身搓摩 壮輔一輕粉鲜 硫黄香 半

をもりをくらう 苦麥丸 治疥癬 掃散 右各等分兩為細末蜜為九空心於清送下或用散 凉蜜水下不過三五服即痊可大人每服用三錢 右為細末油調擦疥癬上黃臭中 荆芥 蔓荆子谷等 苦參 荆芥 治疥癬 防風 地骨皮 薄荷 甘草 何首烏 威靈仙 持濟方 胡麻子 李 苦麥

治疥癣 治疥癬 金人正人人 右為細末水糊為九如梧桐子大每服三十九茶湯 右為未香油調搽 分各 等 硫黄 雄黄 下食後服 井泉石 鵝管石 白礬 盆硝 雌黄寒的上硫黄寒人言許 卷二百七十九 黄栢 碓黄

沙里四事人 治遍身盛養明目與神 撥之成瘡又治面上風刺及婦人 擦シ 班猫針 **威靈甘草石菖蒲** 一錢酒一碗 Į 治肺臟風毒過身 普濟方 **(許和為一塊外用小油化開** 渾身 苦參胡麻何首鳥 人粉刺 一時無 至

五グリルノニ 極細次用諸樂末漸漸入研令自每服二錢食後 石為細末每用樂半錢放手掌中臨取時油調 温酒調下日進三服瘡亦甚者每日頻進 右除杏仁外餘藥都搗羅為末却将杏仁另研令 輕粉後、 积殼去數用炭火燒存性華皮燒成灰十草矣 杏仁熬候水減一 出瘡科 硫黄 是狗将两紅娘子 首大檳榔 治乾濕疥癬 半 取出放冷乾粉芥穗兩 二百七 半 箇

大きりり 糊兩手 立劾 右用清麻油|蓋煎如稀 甚者不過三 忠出方里 白礬半兩也亂髮 A delta ,搓摩極熱鼻內聞之及摩擦疥上隔日再用 惠出方聖 出 妙班猫族 背海方 子大 火雞 (輕粉軍連炙塗一两上 五

治 まりじんる 腺血病店以軟帛拭乾然後用樂 右用搗極細丸如彈子大先以温漿水淋洗瘡 源瘡等疾亦治之 右等分搗為末油調塗之 時辰再用淡漿水不犯手淋洗净須與問瘡 切風癬疥癩腎溼下注風瘡成片經年不瘥者 羊蹄根五塊川乾地上獨 許生薑塊明硫黄料 二百七十九 不行 可用肥皂炭 九滚搽瘡上 停

アとうしりかた へきる 治久疥癖 防風羌活散 薄切片子榻上即瘥 石為細末每服三錢酒調服茶清亦可無時服 九乾了以蜜和開再九之瘡生過脚面以軟乾柿 不愈隔一二日再如此上樂治之二三次必愈如樂 追出紅血絲網為度此係詹內風蟲也見此即瘥如 防風 羌活 治疥癬風瘡 全蝎 皆游方 薄荷 至

雄黃散 多分四月百十 風丸 石為末以猪脂七合和攪不見水銀為度熟博 石為細末好油一盛內巴豆仁十箇熬紫焦 豆調樂抹條疥癬 方加泰蘆一两又云蘭如一两療諸瘡神驗無比 水銀 石膏 治疥癬 治一切風瘡疥癬皮膚極 裝石 杜赐燒各雄黃統武黃 黄連作蛇床子科 成應廠

沙芝四年人的 四生散 切崩夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患亦 此樂主之一名四聖散 右搖為細末用精羊肉煮熟搖爛以酒熬為膏 力 如菉豆大每服三十九荆芥或酒茶湯下 右為細木每服二錢鹽酒湯下空心服若於猪腰子 白附子下汪生幣沙苑族教 黃者 羌活各二 防風去蟬殼各一指牙皂英母是大麻二 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不見 普海方 李

多少世居白事 治疥癬膿泡 治疥癬方 得此樂三四服盡除此方治人腎脏風及眼疾頑 **睡更三四服乃愈再有頑癬經年服藥俱不効後** 眼睛痛不可忍臨臥 川藜蘆細掘為末以生油調數之 癣無不効 以五倍子烧存性為末稻油調塗 一服目及大痛至二鼓時方得

防風散 炎主四草全島 四 治脾肺風毒攻衡生瘡癬方 右為細散每服三錢空心酒調服 用狗舌草為末和塗之即瘥四月五日採並暴乾 右細剉用水二斗 防風去天麻西 陳橘皮婦是去白 癬風瘡 治諸解疥 桃白皮 煎取一 苦琴各半 普遍方 斗去海候温洗之 五七

义方 治諸瘡疥癬久不瘥者 重クロルノコ 停冷取膏去水銀不妨別用以膏傳一切瘡無不 特牛尿人用乳牛羊蹄根半的 右以牛尿清羊蹄根一宿日曝乾復内尿中取盡止 應手立握一方又用水銀粉和猪脂塗之 右以鐵器中壘電用馬通火七日七夜勿住火出之 水銀的順月街脂五 巻二百七十九

次定四車全書 烏龍九 滑肌散 作末傳諸瘡一方和猪脂用更精 利膈化痰唾治肺氣不和此樂惟陳致新去腸垢 右為細末瘡濕用樂乾麥瘡乾用麻油調樂傅 皆治さ 肺風毒攻衝過身瘡疥皴裂或濕發瘡日久不搖 剪草七兩思輕粉一 治過身風瘡廢養於解等疾服之清風熱 治風邪客於肌中 1 告浴方 渾身瘙養至生耄 五十八

九氣血虚者一二十九食後温水送下無病氣實 右將縣末與皂角膏和九如梧桐子大每服三五十 膚光澤水無風痰亦癖之疾一方用酒下 治證甚多要能用度 雨箇月一服取利三五行不傷正氣身體輕健 黑牵牛不拘多少如果拿牛不拘多少 一路湾 治肺受邪毒運於四肢久而不散以 · 動微去 末炒作 苍 二百百 银刮 今 Ł ŀ 器去 内皮 热处 戍槌 灰甜

ただりにという 右為細木酒糊為九如格桐子大每服六七十 内蘇 空心酒下 石為細末乾者香油調數溼者乾來 輝惡瘡方 落木米壮 河首局部 硫黄船白祭村各 哲済方 至九

多分四川人生 凡諸瘡解初生時或始痛癢即以後各單方效之後方 樂三兩上便瘥 蓋煑如鎔膠濾清汁入黃連末半兩輕粉二錢調 以淌尺不蛀皂角三條炙去弦核為末米酯二大 用鹽嚼堂之〇又以穀汁傳之〇又以称墨和傳之 抹候解發時惡水出便可先以椿樹白皮搔破後全 恭作酥〇又以薑黃傅之〇又以鯉魚新糁傳之〇 以牛李子汁傅之若不瘥以前諸大方治之 巻二百七十九

治久於鮮出海生 如聖散出衛科 擦さ 處淋洗水冷即拭乾便脏 以臘猪脂不构多少同生白礬杏仁少加輕粉搖爛 右以盤沙一升水二斗煎至一斗濾去浑夜即避風 治渾身盛癢抓之成瘡及瘾婚

火迁り中心時

以松脂末入輕粉先用油塗却橡上松脂一二次即

普濟方

产

治疥癣有汁

治頑癬久不瘥者 安碩者三兩度瘥 堂内服之次先合下梨蘆荆芥各等分為細末每 用防風通聖散一帖全料依方法煎熟来熱於浴 用一抄就於浴堂內來熱用手揉指樂於瘡患處 用手不住操指為妙次用温湯豁去展拭乾出 如娯再用樂揉指候樂在身上良久然後再澆湯 卷二百七十九 たとりもとき 疥樂神 劲散生生 山梔子散出聖濟 錢再碾又加山茶半兩更妙右為細末先將小油滚 右化開硫黄入荆芥穗末滚數沸候冷再加輕粉 過候冷調樂擦瘡上仍以兩手搓樂開氣神効用荆 **搗山梔子仁為細末炒過以蜜蒸三五度五更時酒** 湯下一匙許 拱椰一全妈 两蛇床子 两传硫黄十 治氧濕腺窠諸腫疥癬等證有効 冶一切解於 哲済す . नौर् 卒

附子膏出聖 多方になる事 四聖膏 膏成旋取塗之 石將油馒火熬次下巴豆當歸熬至黑焦不用又 石先以猪脂煎魚亂髮令消濾去渣入附子末熱攪 清油半巴丘去疫當歸水輕粉一 附子也為未即魚五寸 制髮子大猪脂兩 治風府鄉於或痛經年不効者及一切惡瘡 治一切疥癬惡瘡不搖 卷二百七十 'n

火亡り事人自与 · 图 水銀膏出聖 石為細末散以生麻油調塗於兩手心合手於股內 臭黄 弱髮烧蕪夷 哈黄的新杏仁浸去 皮 八蠟輕粉豬開冷定盆子威每用量瘡搽之 仁研吳菜與物料細研兴與人 一宿如未痊者次夜更塗兼喫蜜酒使醉神 治風瘡疥癬久不瘥 治疥癣瘡經年不瘥 普濟方 华二


多方正人人 治解及惡瘡疥蜘蛛咬者 浴遍身瘡疥及厲風癬 右入煉好指脂半的都研候水銀星盡便用數之日 以滚鹽水浴之極妙 用生鐵同蒜居生油數並得 二兩上無治小兒頭瘡 満身作瘡不可治者後方 白礬 蛇床子 老二百七十九 雄黄 関数一两 各

治久疥 治白癡瘧傷及風惡瘡癬 をとりをという 肌一方有艾等分 香温洗え 用何首爲以水煎令濃於盆中 **用絡石木連藤取汁數瘡上** 以月鳥頭七枚生用搖碎以水三大盛煎一 出聖 **蛮扁不可忍者** 普瀬方

治 金と人にんれて 黄膏出楊氏 先用泔清洗瘡去痂拭乹看瘡大小用硝石研 神劾 取巴豆四五粒細研以油一 和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度瘥 先喫山梔子湯一碗夜塗此樂一雨上瘡痂乾剥 一切疥癬方出聖 雄黄奶雌黄奶配各半线吃白糕奶蛇床子取 家藏方 治瘡癬疥癆紫白癜風 卷二百七十九 合半以慢火熬一食之

交主四年1号 下 麝香蘭如散出根氏 聚藥又入黄蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後 右体 簡如末同研与每用三錢生麻油調成會抓破 用樂棒之 瘡疥擦之日三兩次用 右仰用麻油四两入巴豆四枚煎黄色去巴豆入各 麝香三钱水银分結砂子 蘭好一两 白膠香另研輕粉 - 特海方 治疥癬 黄丹 六点

石脂膏出海生 金グリルノヨー 服之 右為細末栗米和飯九如梧桐子大每服三十九 右研巴豆令極細餘並為細末入巴豆和勻煉豪 心米飲送下 苦參 柏油的黄蠟半杏仁四十五小硝)出か薬 治肺毒邪熱頭面生瘡疥癬並宜 治乾溼疥癬 卷二百七十九



用醋磨鐵銹水兼炒過青鹽白攀擦之 人しルノー 刮東向見日壁泥摩察良 以雞子殼燒灰油調搽 一散出就 與寒水石處蛇床子少雨 雄黄 可用碎熟硫黄两 班指 **鈴出** オポ 鈴方斯 治諸般疥癬必効 卷二百七十九 足三 研碎 黑狗


於定四車全書 治一切男女人渾身疥癬一家易染經年極痒不効者 命出 方護 火炙湯燙者加硫黄即嗅不止亦愈 痛甚腫湍禹起者加寒水石一倍如不苦養只如狗 **脊如微癢只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜** 調手中擦熱臭中哭三兩次擦上可一上即愈也如 右另研雄黄硫黄寒水石如粉次入斑猫和匀蛇庄 子黑狗称另為細末同研与先用湯洗疥癬去痂油 普癬す なな


打グ 三神九出十便 右以油五雨煎令得所去樂却用麝香一分膩粉 右件樂研令極細分作二服小兒作五服溫酒調 機五七沸磁器盛之非時使也 一錢硫黄半兩雄黄半兩同研令与入在油內更煎 ロガベニー 李叔與腳魚小如成片 也龍 八時稍去毒白殭蠶二十四枚 百部平城制髮 治一切疥癬 木香好檳榔姓苦寒谷 分

CINDENS LINES 治重能亦解瘦蟲咬出本 五龍膏以十便 右五味等分為細末煎油調塗之 用碧海水煮浴之 以鹽膽水敷之瘡有血者不可敷 硫黄 解出本 然後浴 白裝白芷 治疥癬 草 普湾方 川椒 だも


治詹 治瘡痍風盛盛癢 南江四月全華 治乾濕解於出本 取野学根酯摩敷之 以海桐皮水煮服 以胡粉 以對樟皮煎湯洗之 出本 分粉之即瘥 -出本 草 卷二百七十九 出本 草

火とりまれたから 治風疹 治疥癬草本 方草 以百部根火炙浸酒空腹飲之 用攀石和桃仁葱湯浴之可出汗也 取柳白皮細切以猪脂煎取汁傳 出本 倉出本 普灣方





スカ 金元人工一個人 ス
方 又方 用羊蹄根据綾取汁入脈粉少許調如膏塗癬 用獨裔肉以酒浸汁令熱傳瘡上令更易其肉不可 用菖蒲根据為末油調塗之 食即棄之 五遍即浑如轧即用猪脂調和數之 巻二百七十九



金定四库全書 普濟方卷二百七十九 卷二百七十九